

Κοινές ανεπιθύμητες ενέργειες (δεδομένα από τη δοκιμή της Pfizer-BioNTech)

- 84% τοπικές αντιδράσεις (στο σημείο της ένεσης)

Συστηματικές

- 63% κόπωση
- 55% κεφαλαλγία
- 38% μυαλγίες
- 32% ρίγος
- 24% αρθραλγίες
- 14,2% πυρετό (Συνηθέστερα σε νεαρά άτομα-Υποχώρησε μετά 1-2 μέρες)

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

(ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ Pfizer-BioNTech)

- Παιδιά
 - Εγκυμοσύνη
- } Δεν υπάρχουν δεδομένα από κλινικές δοκιμές

- Γνωστή αλλεργία στα έκδοχα του εμβολίου
- Σοβαρό εμπύρετο νόσημα
- Αιμορραγική διάθεση ή αντιπηκτική αγωγή που θα μπορούσε να προκαλέσει αιμορραγία στο σημείο του εμβολιασμού
- Ενεργός ν. COVID-19

(*για παρελθούσα νόσο δεν υπάρχουν δεδομένα αν είναι να γίνει εμβολιασμός θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων ή θετική PCR)

- Ιστορικό σοβαρής αναφυλακτικής αντίδρασης κατά το παρελθόν*
- Στους ανοσοκατεσταλμένους δεν υπάρχουν δεδομένα- τυπικά δεν υπάρχει αντένδειξη, αλλά αναμένεται χαμηλή ανοσιακή απάντηση

